

Vaksinasi Booster Lansia Bisa Dilakukan Setelah 3 Bulan Terima Vaksin Lengkap, Kasus Covid-19 di Kabupaten Samosir Jadi 430 Kasus,

Karmel - SAMOSIR.INDONESIASATU.ID

Feb 26, 2022 - 04:37

Kabar Terbaru terkait Vaksinasi Booster untuk Lansia*

- 1** dapat diberikan dengan interval **min. 3 bulan** setelah vaksinasi primer lengkap
- 2** dapat dilakukan secara homolog atau heterolog, sesuai ketersediaan di lapangan**
- 3** booster ini dapat menggunakan vaksin selain Sinovac

* Berdasarkan Surat Edaran Kemenkes No.SR.02.06/11/1123/2022 dan berlaku sejak 21 Februari 2022

** **homolog:** jenis vaksin booster = jenis vaksin primer --
heterolog: jenis vaksin booster ≠/≠ jenis vaksin primer

Ayo Pakai Masker, Ayo Cepat Vaksin

Kementerian Komunikasi dan Informatika - RI

Gambar Dari Kominfo

SAMOSIR- Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Kesehatan Kabupaten

Samosir, saat ini jumlah kasus terinfeksi Covid-19 di Kabupaten Samosir sebanyak 430 orang perhari, Kamis (24/2/2022)

Kenaikan kasus terinfeksi Covid-19 tersebut disampaikan Plt Kepala Dinas Komunikasi dan informatika (Kominfo) yang juga sebagai juru bicara Satgas Kabupaten Samosir, Ricky Rumapea, Jumat (25/02/2022)

Ricky Rumapea juga menyampaikan, untuk menekan laju penyebaran virus Covid 19, maka pelaksanaan vaksinasi baik dosis satu dan dosis dua serta vaksinasi Booster terus digenjut di Kabupaten Samosir.

Upaya ini diharapkan dapat menekan dapat mencegah penyebaran Covid-19, Sembari masyarakat tetap disiplin protokol kesehatan untuk menekan jumlah kasus aktif," kata Ricky.

Dalam keterangan tertulisnya, Plt Kepala Dinas Komunikasi dan informatika (Kominfo) yang juga juru bicara Satgas menyampaikan kabar terbaru bagi para lansia "Lansia sudah dapat divaksin booster setelah tiga bulan menerima vaksin lengkap sesuai dengan Surat Edaran Kemenkes No. SR.02.06/II/1123/2022

"Kementerian Kesehatan merilis ketentuan terbaru terkait dengan vaksinasi booster pada lansia. Berdasarkan Surat Edaran Kemenkes No. SR.02.06/II/1123/2022 yang berlaku sejak 21 Februari 20221,

Maka vaksin booster dapat diberikan dengan interval min. 3 bulan setelah vaksinasi primer lengkap. Selain itu, vaksinasi booster dapat dilakukan secara homolog (jenisnya sama dengan vaksin primer) atau heterolog (jenisnya berbeda dengan vaksin primer), sesuai ketersediaan di lapangan dan dapat menggunakan vaksin selain Sinovac

Untuk informasi terkait COVID-19 kunjungi situs resmi Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional [https:// covid19. go.id/](https://covid19.go.id/) dan kunjungi <https://s.id/infovaksin> untuk dapatkan berbagai informasi mengenai vaksin COVID-19. (Karmel)